



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DE LOS CONEJOS EN MÉXICO

SEPTIEMBRE DE 2025



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Enfermedad hemorrágica viral de los conejos



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



¿Qué es?

- * Enfermedad viral altamente contagiosa que afecta únicamente a lagomorfos (conejos y liebres)
- * Se informó por primera vez en China en 1984, se presentó en México en 1988
- * Provocada por el virus del género *Lagovirus* de la familia Caliciviridae (con 6 genotipos)

La EHVC tipo 1 afecta a miembros domésticos y silvestres de la especie *Oryctolagus cuniculus*

La EHVC tipo 2 afecta a miembros domésticos y silvestres de la especie *Oryctolagus cuniculus* y otras especies como:



Sylvilagus floridanus



Romerolagus diazzi



Lepus alleni tiburonensis



Lepus californicus



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Enfermedad hemorrágica viral de los conejos



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Signos clínicos

Los animales afectados presentan:

- * Fiebre
- * Depresión
- * Falta de apetito
- * Ojos amarillentos
- * Hemorragias oculares
- * Secreción nasal sanguinolenta
- * Dificultad para respirar
- * Excitación
- * Incoordinación
- * Rigidez corporal

Muerte generalmente de 12 a 36 horas después del comienzo de la enfermedad.

Ocasionalmente solo manifiestan chillidos terminales, colapso y muerte.



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

Signos clínicos



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Ictericia de la conjuntiva y la esclerótica

Epistaxis

Muerte súbita



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos





Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Lesiones

No son patognomónicas, pero se puede encontrar:

- * Hiperemia y presencia de líquido espumoso sanguinolento en tráquea
- * Hemorragias multifocales y congestión en pulmones
- * Necrosis delimitada o generalizada en el hígado
- * Esplenomegalia
- * Coloración marrón oscuro de los riñones




2025
Año de
La Mujer
Indígena

Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

Antecedentes



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




Activación del DINESA

El 26 de junio del 2020 se publicó en el DOF el ACUERDO mediante el cual se activa, integra y opera el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA), para el control y en su caso, erradicación de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, tipo 2 (EHVC2) en los estados de Chihuahua y Sonora, así como para prevenir su diseminación dentro del territorio nacional.

En febrero de 2021 se publicó en el DOF la prorroga y ampliación del ACUERDO por seis meses más, para continuar con las medidas contraepizooticas.



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

Acciones desarrolladas

- * Recorridos en campo para promover la notificación de casos
- * Distribución de material de difusión
- * Rastreo de posibles casos (visitas domiciliarias)



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Enfermedad HEMORRÁGICA VIRAL de los CONEJOS

¿CÓMO SE TRANSMITE?
El virus se encuentra en **SECRECIONES Y EXCRECIONES** de los **animales infectados** (fluido ocular y nasal, orina y heces). Puede **TRANSMITIRSE** por contacto directo o por medio de personas, vehículos, material o equipo contaminado con el virus.

¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE?
Es necesario **CONTROLAR LA IMPORTACIÓN DE ANIMALES Y PRODUCTOS**, así como fortalecer las medidas de **BIOSEGURIDAD** en las unidades de producción.

SIGNOS CLÍNICOS

- Fiebre
- Depresión
- Falta de apetito
- Hemorragias oculares
- Secreción nasal espumosa sanguinolenta
- Dificultad para respirar
- Excitación
- Incoordinación
- Rigidez corporal
- Muerte, después de 12 a 36 hrs. al comienzo de la enfermedad

- Ocasionalmente solo manifiestan chillidos terminales, colapso y muerte repentina

NOTIFICA CUALQUIER CASO SOSPECHOSO
Teléfono de emergencia las 24 horas los 365 días:
800 751 2100
Lun a Vie: 55 5905 1000 Ext. 51236, 51242 y 51243 Correo electrónico: shv.dgsa@senasica.gob.mx o gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

Descarga App
CPA
avise



GOBIERNO DE MÉXICO

AGRICULTURA

SENASICA

Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

Acciones desarrolladas

Atención de notificaciones por sospecha



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

Focos en conejos domésticos

Del 3 de abril de 2020 al 30 de junio del presente año se han confirmado 507 casos de la EHVC tipo 2 en conejos de 20 estados del país.



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



ESTADO	TOTAL
EDO. MEX.	98
HIDALGO	67
PUEBLA	56
CHIHUAHUA	41
ZACATECAS	36
BAJA CALIFORNIA	32
DURANGO	29
JALISCO	26
BAJA CALIFORNIA SUR	21
GUANAJUATO	17
TLAXCALA	14
QUERÉTARO	13
CIUDAD DE MÉXICO	13
AGUASCALIENTES	10
COAHUILA	10
SONORA	9
SAN LUIS POTOSÍ	6
MORELOS	4
VERACRUZ	4
CHIAPAS	1



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

Focos en conejos domésticos



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

Medidas contraepidémicas

Despoblación de predios afectados



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

Medidas contraepidémicas

Limpieza y desinfección de predios afectados



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Medidas para su prevención

Gracias a la colaboración entre el Senasica y la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) se logro elaborar la vacuna para la prevención de la EHVC T2, la cual fue desarrollada en un tiempo record.

En todo el país se distribuyeron 509,683 dosis de vacuna, siendo el Estado de México e Hidalgo las entidades donde más se distribuyó



ESTADO	TOTAL
EDO. MEX.	171,863
HIDALGO	150,490
PUEBLA	34,892
JALISCO	14,530
CDMX	13,370
QUERÉTARO	23,646
GUANAJUATO	10,013
VERACRUZ	116
YUCATAN	6,080
MORELOS	9,671
MICHOACAN	6,948
ZACATECAS	307
BAJA CALIFORNIA	5,289
SLP	1,488
TLAXCALA	19,067
OAXACA	2,579
COAHUILA	10,006
AGUSCALIENTES	4,879
NUEVO LEON	1,238
CHIHUAHUA	3,514
CHIAPAS	5,542
DURANGO	9,106
BAJA CALIFORNIA SUR	984
SONORA	224
GUERRERO	595
CAMPECHE	1,080
QUINTANA ROO	186
NAYARIT	823
SINALOA	1,157



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

Medidas para su prevención

Vacunación en zonas perifocales a los brotes por personal del DINESA



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

Medidas para su prevención

Primera y única vacuna para conejos autorizada por el SENASICA

Genera inmunidad aproximadamente por un año y se puede utilizar para inmunizar conejos silvestres y conejos de compañía



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



VEHC-2-BIVE

Registro: B-0653-062.

Vacuna monovalente inactivada contra el virus de la enfermedad hemorrágica de los conejos tipo 2 (CPA-01426-20)

FORMA FARMACÉUTICA: Suspensión.
ESPECIES: Conejos clínicamente sanos.



Primera vacuna autorizada para **prevenir la EHVC T2**



Recomendada en **conejos de producción, pie de cría y mascotas.**



Vacunación a partir de las **8 semanas** de edad.



Frasco con 20 dosis listo para usar **no requiere reconstituir**



Genera inmunidad a partir de los **7 días** de aplicación



Protección anual
Revacunar a los **12 meses**



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Enfermedad hemorrágica viral de los conejos




Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Medidas para su prevención

Para comprobar la efectividad del biológico en campo, se estableció un tamaño de muestra estadístico, la población objetivo fue de conejos con peso al mercado, descendientes de hembras vacunadas contra la EHVC T2, se obtuvieron 5 muestras de suero sanguíneo por predio.

Monitoreo serológico en conejos descendientes de hembras vacunadas



n=5

Títulos de anticuerpos ■ 1:10 ■ 1:160 ■ 1:320 ■ 1:640 ■ 1:1280

Los resultados obtenidos muestran la presencia de anticuerpos neutralizantes en conejos de 90 días hijos de madres vacunadas.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Estado	No. de predios a muestrear
Aguascalientes	2
Baja California	2
Baja California Sur	2
Chiapas	2
Chihuahua	2
Ciudad de México	2
Coahuila	2
Durango	2
Edo. Mex.	36
Hidalgo	27
Jalisco	2
Morelos	2
Nuevo León	2
Oaxaca	2
Puebla	2
Querétaro	4
San Luis Potosí	2
Sonora	2
Tlaxcala	2
Yucatán	2
Zacatecas	2
Total	103



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Gracias



Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA