

Buenas Practicas de Producción Cunícola

Bioseguridad en la unidad de producción

Universidad Autónoma Chapingo

MVZ Maria Beatriz Mendoza Alvarez

Septiembre 2025


Problemática

El productor conoce la cría de conejos, sin embargo la producción en las granjas adolece de una programación adecuada

Falta de inversión tanto en la infraestructura (instalaciones), equipo, como en mano de obra.


No existen programas de prevención zoonosológicas

No existen un programa de reemplazos que permita que la producción se mantenga estable, y limpia un buen reemplazo asegura reproductores limpios, sanos y productivos.






Universidad Autónoma Chapingo






Universidad Autónoma Chapingo








Factores que incubaran los problemas sanitarios

- Alojamientos pequeños con alta densidad de animales
- Edificios viejos con grietas, ranuras, mala ventilación con humedad y poca luz solar.
- Mala alimentación de los conejos (no balanceada)
- Entrada de nuevos animales en la granja y la presencia de ratas o ratones





Universidad Autónoma Chapingo



✓ Normas sanitarias para conejos, aun cuando no existe una norma oficial única específica, se basan en principios de **bioseguridad, manejo adecuado, higiene, instalaciones apropiadas y nutrición balanceada**, siguiendo buenas practicas de producción orientadas para prevenir enfermedades y asegurar el bienestar animal.


✓ Control de enfermedades de reporte obligatorio (SENASICA)


- ✓ Enfermedad Hemorrágica del Conejo (EHC) serotipo 1 y 2
- ✓ Mixomatosis


✓ NOM-FF-105-SCFI-2005 Establece las características de las canales de conejos para el abasto, asegurando la calidad del producto para los consumidores


✓ 3 oct 2022 NORMAS DE BIOSEGURIDAD Emplazamiento y diseño de las naves adecuado. Aislar la granja del exterior mediante una valla protectora

✓ MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION la secretaria en términos de la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA) y su reglamento, emitirá las disposiciones que definirán los criterios y especificaciones









Manejo en bandas

PLANTEADO							
s	d	l	m	m	j	v	s
1				C			
2							
3	PL						
4							
5			PN				P
6							
7				C			
8						SN	
9							
10		DTT					
11							
12							
13							
14							
15							
16		S					

Simbología

C = CUBRICION

PL = PALPACION


PN = PONER NIDO


P = PARTO

SN = SACAR NIDO

DTT = DESTETE


S = SACRIFICIO





Diagnóstico de gestación (palpación)








Disminución del numero de gazapos muertos por jaula

Porcentaje de Mortalidad




Mortalidad inicial 40%.


Mortalidad al finalizar la estancia 14%.



Factores a considerar en problemas sanitarios

- Evitar condiciones de stress.
- Controlar las visitas en general
- Controlar el microclima de la granja
- Evitar corrientes de aire
- Evitar las concentraciones altas de amoniac (Tufo a conejo)
- Evitar suelos húmedos y polvorientos
- Eliminar el pelo del conejar
- Buen almacenamiento del alimento
- Depósitos tuberías y bebederos limpios
- Limpiar paredes, techos, puertas y ventanas
- Limpiar jaulas y niales en cada ciclo





HIGIENE Y BIOSEGURIDAD EN CONEJOS

INSTALACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

MÉTODOS FÍSICOS MÉTODOS QUÍMICOS

UTILIZACIÓN DE TAPETES Y VADOS SANITARIOS




Medio ambientales

- Temperatura
- Humedad Relativa
- Foto periodo

Sanitarias

- Stress ambiental
- Respiratorias
- Digestivas
- Lesiones aparato locomotor
- Infecciones del aparato reproductor








EQUIPO


Limpiar y desinfectar jaulas,
comederos, nidales en cada ciclo

Depósitos, tuberías y bebederos
limpios

Limpieza y desinfección de equipo en
la jaula de engorda al destete

Utilizar la rotación de desinfectantes






- PROTECCION


- PROTEGER LA ENTRADA DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES

- CONTROL DEL MICROBISMO AMBIENTAL

- DESINFECCIÓN
 - DESINSECTACIÓN
 - DESRATIZACIÓN

- CONTROL DE VISITAS EN GENERAL







ANIMALES

Cuarentenar a los animales de reciente adquisición

No prestarse sementales entre granjas

Revisión sanitaria de los reproductores (hembras y machos)

Tener un adecuado programa de reemplazo de reproductores

Programas profilácticos (problemas: respiratorios, digestivos, cutáneos)

